

Ankylos®

CASO CLÍNICO: REHABILITACIÓN DE DESDENTADO TOTAL BIMAXILAR MEDIANTE IMPLANTES DE CARGA INMEDIATA CON SISTEMA DE PILARES SYNCON. RESTAURADOS CON SOBRE-DENTADURA REMOVIBLE TELESCÓPICA INFERIOR.




DRA. CATALINA NANCUVILU M.
CIRUJANO DENTISTA UNIVERSIDAD DIEGO
PORTALES.
LICENCIADA EN ODONTOLOGIA Y ESTOMATOLOGIA.
ESPECIALISTA EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA
ORAL UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES.
DIPLOMADO EN REHABILITACION SOBRE IMPLANTES.

PROFESORES ASESORES:
DR. ANTONIO LLORENTE.
DR. HECTOR NORERO C.

Antecedentes del paciente:

- Paciente sexo masculino 61 años, ASA II, fumador pesado, en tratamiento ANTABUS, desdentado total superior e inferior, rebordes residuales disminuidos, no utiliza prótesis desde hace 10 años.
- Ocupación: comerciante.
- Motivo de consulta: ponerse implantes para recuperar su dentición.
- Paciente con antecedentes de alcoholismo.
- Historia médica de hemorragia gastrointestinal consecuencia de una intoxicación etílica, hace 6 años, de resolución quirúrgica.
- No recibía control médico desde esa época..
- Actualmente en tratamiento ANTABUS 1 vez al día, y Amitriptilina 2 veces al día.
- Se solicitó chequeo médico completo, con mayor énfasis en función hepática y renal.
- Control cardiovascular y glicémico normales.
- Paciente sin contraindicaciones para la anestesia local
- Paciente relata haber ido perdiendo dientes paulatinamente desde los 30 años aproximadamente y el motivo de desdentamiento es aparentemente periodontal ya que el relata que "se le soltaban los dientes y el mismo se los sacaba".
- En un periodo aproximado de 20 años se produjo un desdentamiento total del paciente que coincide con su etapa de alcoholismo agudo.





Maxilar superior: desdentado hace 10 años, no utiliza prótesis, reborde residual favorable en alto y ancho para soportar una prótesis removible total



Mandíbula: desdentado total hace 10 años, no utiliza prótesis, reborde residual disminuido en alto y ancho, sobretodo en zona posterior. Espesor encía adherida 2-3mm.

Tratamiento preliminar Prótesis totales maxilo-mandibular.



Se realizó juego de prótesis total acrílica removible, se le devolvió la dimensión vertical al paciente la cual se encontraba muy disminuida debido a su larga data de desdentamiento total. El paciente tuvo una muy buena adaptación a sus prótesis a pesar de no haber usado nunca antes prótesis.


Prótesis en función.




Cirugía de instalación de implantes.

Se realiza la cirugía de instalación de 4 implantes Ankylos, para la técnica de Syncone en la zona antero inferior.







Implantes instalados en posición sub-ósea.



Pilares Syncone en posición final.




Dispositivos para comprobación de paralelismo.




Cierre del colgajo.

Simultáneamente se prepara prótesis total removible inferior para capturar los casquetes metálicos del sistema Syncone.



Discos de goma para aislación intraoral.

Se posicionan los casquetes metálicos y se procede a cubrir todo el casque conacrílico rosado para prótesis, inmediatamente después de finalizada la cirugía de instalación de implantes.



Se retira la prótesis inferior después de haber capturado por arrastre los casquetes metálicos.




Se procede a terminar la prótesis inferior quedando lista para su instalación.



Entrega de prótesis inferior.

Radiografía de Control



Conclusión:

El sistema de rehabilitación para sobredentadura telescópica Syncone es una excelente alternativa de carga inmediata para pacientes desdentados totales ya que ofrece un protocolo clínico rápido y sencillo y una muy buena adaptación por parte del paciente, ya que cumple con la expectativa de recuperar su sonrisa en una sola sesión.

Ankylos®

Estética Natural de larga duración.
Conexión cónica sin micromovimiento.
Resistencia y Estabilidad.
Opción de Indexación.

